

都道府県別医療費に関する レーダーチャート等(抜粋)


平成20年度

※ 平成22年1月に協会けんぽのHPにおいて公表している


北海道(平成20年度)

性別に分けて表示


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院分を追加

入院の医療費の上位10疾病

北海道			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	8.3%
2	虚血性心疾患	○	5.0%
3	良性新生物		4.7%
4	他の消化器系の疾患		4.6%
5	肺の悪性新生物	○	3.2%
6	他の心疾患	○	3.0%
7	他の妊娠、分娩及び産後		2.8%
8	他の損傷及び他の外因の影響		2.8%
9	他の神経系の疾患		2.6%
10	骨折		2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	19.5%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産後		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

北海道			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.8%
2	糖尿病	○	6.3%
3	喘息		5.1%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.0%
5	他の急性上気道感染症		2.9%
6	他の消化器系の疾患		2.5%
7	アレルギー性鼻炎		2.3%
8	腎不全		2.3%
9	胃及び十二指腸潰瘍		2.3%
10	急性気管支及び細気管支炎		2.3%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	22.2%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値
年次: 平成20年7月～平成21年3月
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合

北海道(平成20年度)

健診データについての全国値との比較

項目追加
項目追加


健診の指標
メタボリックシンドロームのリスク保有率
腹囲のリスク保有率
血圧のリスク保有率
脂質のリスク保有率
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率
喫煙者の割合
BMIのリスク保有率(参考)
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)

北海道		
全体	男性	女性
13.9%	18.2%	2.8%
37.1%	47.0%	11.2%
39.9%	44.6%	27.6%
26.8%	33.6%	9.2%
16.4%	20.0%	7.0%
49.2%	55.6%	32.3%
30.4%	34.7%	19.2%
24.2%	30.3%	8.5%
7.1%	9.4%	1.3%

全国		
全体	男性	女性
11.9%	16.5%	2.8%
34.0%	45.2%	11.9%
37.1%	42.3%	26.8%
24.5%	32.3%	9.0%
14.4%	18.1%	7.0%
39.2%	49.9%	18.0%
26.2%	30.6%	17.6%
22.4%	29.5%	8.4%
5.9%	8.2%	1.2%


データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



新規に追加

性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

長野県(平成20年度)


性別に分けて表示

医療費に関するレーダーチャート




入院分を追加

健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

長野県				
順位	傷病名	生活習慣病	割合	
1	他の悪性新生物	○	8.1%	
2	他の消化器系の疾患		4.9%	
3	良性新生物		4.0%	
4	他の妊娠、分娩及び産じょく		4.0%	
5	虚血性心疾患	○	3.1%	
6	骨折		3.1%	
7	他の損傷及び他の外因の影響		2.9%	
8	他の神経系の疾患		2.7%	
9	他の心疾患	○	2.6%	
10	脳梗塞	○	2.6%	

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	165%
-------------------------	------

全国				
順位	傷病名	生活習慣病	割合	
1	他の悪性新生物	○	7.4%	
2	他の消化器系の疾患		4.8%	
3	良性新生物		4.4%	
4	虚血性心疾患	○	4.3%	
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%	
6	他の心疾患	○	3.1%	
7	骨折		2.8%	
8	肺の悪性新生物	○	2.7%	
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%	
10	他の神経系の疾患		2.4%	

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	175%
-------------------------	------

入院外の医療費の上位10疾病

長野県				
順位	傷病名	生活習慣病	割合	
1	高血圧性疾患	○	11.0%	
2	糖尿病	○	5.6%	
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.0%	
4	喘息		3.2%	
5	他の急性上気道感染症		3.1%	
6	腎不全		3.0%	
7	皮膚炎及びびびる疹		2.7%	
8	アレルギー性鼻炎		2.5%	
9	急性気管支及び細気管支炎		2.1%	
10	他の神経系の疾患		2.1%	

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	206%
-------------------------	------

全国				
順位	傷病名	生活習慣病	割合	
1	高血圧性疾患	○	10.9%	
2	糖尿病	○	5.8%	
3	喘息		4.3%	
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%	
5	他の急性上気道感染症		3.6%	
6	アレルギー性鼻炎		2.9%	
7	皮膚炎及びびびる疹		2.9%	
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%	
9	他の消化器系の疾患		2.1%	
10	腎不全		2.1%	

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	209%
-------------------------	------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値
年次:平成20年7月～平成21年3月
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合

長野県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較

項目追加

項目追加



健診の指標
メタボリックシンドロームのリスク保有率
腹囲のリスク保有率
血圧のリスク保有率
脂質のリスク保有率
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率
喫煙者の割合
BMIのリスク保有率(参考)
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)

長野県		
全体	男性	女性
10.8%	16.0%	2.9%
29.3%	41.3%	10.5%
38.5%	44.0%	29.9%
22.2%	30.7%	8.9%
13.8%	18.0%	7.2%
33.9%	47.5%	12.8%
23.1%	27.6%	16.0%
20.5%	28.3%	8.4%
4.5%	6.7%	1.0%

全国		
全体	男性	女性
11.9%	16.5%	2.8%
34.0%	45.2%	11.9%
37.1%	42.3%	26.8%
24.5%	32.3%	9.0%
14.4%	18.1%	7.0%
39.2%	49.9%	18.0%
26.2%	30.6%	17.6%
22.4%	29.5%	8.4%
5.9%	8.2%	1.2%


データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



新規に追加

性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)



データ:レセプト基本情報データを使用した集計値


年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値

注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む


埼玉県(平成20年度)

性別に分けて表示


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院分を追加

入院の医療費の上位10疾病

埼玉県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.9%
3	良性新生物		4.9%
4	虚血性心疾患	○	3.6%
5	他の妊娠、分娩及び産後		3.4%
6	脳梗塞	○	3.1%
7	他の心疾患	○	3.0%
8	骨折		2.8%
9	他の神経系の疾患		2.6%
10	統合失調症及び妄想性障害		2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.0%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産後		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.6%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

埼玉県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.8%
2	糖尿病	○	5.9%
3	喘息		4.6%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.6%
5	他の急性上気道感染症		3.5%
6	アレルギー性鼻炎		3.2%
7	皮膚炎及びび瘡		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.1%
9	屈折及び調節の障害		2.1%
10	胃及び十二指腸潰瘍		2.0%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.3%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びび瘡		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値
 年次: 平成20年7月～平成21年3月
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合

埼玉県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


項目追加

項目追加

健診の指標	埼玉県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.4%	15.8%	3.1%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	33.3%	44.4%	12.3%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	35.7%	40.3%	27.3%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.5%	32.0%	10.3%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.6%	17.0%	7.2%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.0%	48.5%	21.0%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.4%	30.7%	18.3%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.2%	28.9%	9.7%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.4%	9.0%	1.4%	5.9%	8.2%	1.2%


データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ
年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



新規に追加

性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)



データ: レセプト基本情報データを使用した集計値

年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値

注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

[参考]

○医療費データについて

- ・レーダーチャートの医療費、平均加入者数は、協会けんぽ月報による実績(平成20年4月～平成21年3月)である。
- ・傷病別と年齢階級別の医療費は平成20年7月～平成21年3月分のレセプトの集計値(1ヶ月平均)であり、年齢階級別平均加入者数は各月末の加入者情報の集計値である。
- ・都道府県別の医療費は、加入者の事業所所在地の都道府県毎に集計したものの。

○健診データについて

- ・各リスク保有率は、平成20年度の協会けんぽ(政府管掌健康保険)における被保険者の生活習慣病予防健診(一般健診、付加健診)の受診者のうち、次の者の占める割合としている。
- ① メタボリックシンドロームリスク保有率は、②に加え、③～⑤のうち2項目に該当する者
- ② 腹囲のリスク保有率は、男性は85cm以上、女性は90cm以上の者
- ③ 血圧のリスク保有率は最高血圧が130mmHg以上または最低血圧が85mmHg以上の者
- ④ 脂質のリスク保有率は中性脂肪が150mg/dl以上の者またはHDLコレステロールが40mg/dl未満の者
- ⑤ 代謝(空腹時血糖)のリスク保有率は空腹時血糖が110mg/dl以上の者
- ⑥ 喫煙者の割合は問診票において喫煙者であると回答した者
- ⑦ BMIのリスク保有率はBMI(肥満度)が25以上の者
- ⑧ 脂質(中性脂肪)のリスク保有率は中性脂肪が150mg/dl以上の者
- ⑨ 脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率はHDLコレステロールが40mg/dl未満の者

都道府県別医療費等のマップ（平成20年度）


【医療費】	
○1人当たり医療費（合計、入院、外来）	1
○入院（受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費）	4
○外来（受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費）	5
※ 【高血圧・高脂血症・糖尿病の医療費（外来）】	6
○1件当たり医療費	
○1件当たり日数・1日当たり医療費	
【健診】	
○メタボリックシンドロームリスク保有率	12
○腹囲リスク保有率	13
○血圧リスク保有率	14
○脂質リスク保有率	15
○代謝（空腹時血糖）リスク保有率	16
○喫煙者の割合（参考）	17
○BMIリスク保有率（参考）	18
○中性脂肪リスク保有率（参考）	19
○HDLコレステロールリスク保有率（参考）	20

※ 本年度においては、外来レセプトと調剤レセプトを接続させることで、傷病別医療費の地域ごとの比較を行っている。


※ 平成22年1月に協会けんぽのHPIにおいて公表している。

1人当たり医療費(入院・外来(調剤を含む)合計)


0
~120,699
120,700
~123,699
123,700
~126,699
126,700
~129,699
129,700
~132,699
132,700
~135,699
135,700




1人当たり医療費(入院)




1人当たり医療費(外来(調剤を含む))




受診率(入院)






1件当たり日数(入院)




1日当たり医療費(入院)









1件当たり医療費(高血圧、外来(調剤を含む))




1件当たり日数(高血圧、外来)




1日当たり医療費(高血圧、外来(調剤を含む))




1件当たり医療費(高脂血症、外来(調剤を含む))




1件当たり日数(高脂血症、外来(調剤を含む))




1日当たり医療費(高脂血症、外来(調剤を含む))




1件当たり医療費(糖尿病、外来(調剤を含む))




1件当たり日数(糖尿病、外来)




1日当たり医療費(糖尿病、外来(調剤を含む))




メタボリックシンドロームのリスク保有率(男)




メタボリックシンドロームのリスク保有率(女)




腹囲のリスク保有率(男)




腹囲のリスク保有率(女)




血圧のリスク保有率(男)




血圧のリスク保有率(女)




脂質のリスク保有率(男)




脂質のリスク保有率(女)




代謝のリスク保有率(男)




代謝のリスク保有率(女)





喫煙者の割合(男)(参考)




喫煙者の割合(女)(参考)







中性脂肪のリスク保有率
(男)(参考)




中性脂肪のリスク保有率
(女)(参考)



HDLコレステロールのリスク
保有率(男)(参考)



HDLコレステロールのリスク
保有率(女)(参考)



[参考]

○医療費データについて

- ・ 傷病合計の医療費、平均加入者数は、協会けんぽ月報による実績（平成20年4月～平成21年3月）である。
- ・ 傷病別の医療費は、平成20年7月～平成21年3月分のレセプトの集計値（1ヶ月平均）であり、入院外レセプトと調剤レセプトを接続させている。
- ・ 都道府県別の医療費は、加入者の事業所所在地の都道府県毎に集計したもの。

○健診データについて

- ・ 各リスク保有率は、平成20年度の協会けんぽ（政府管掌健康保険）における被保険者の生活習慣病予防健診（一般健診、付加健診）の受診者のうち、次の者の占める割合としている。

- ① メタボリックシンドロームリスク保有率は、②に加え、③～⑤のうち2項目以上に該当する者
- ② 腹囲のリスク保有率は、男性は85cm以上、女性は90cm以上の者
- ③ 血圧のリスク保有率は最高血圧が130mmHg以上または最低血圧が85mmHg以上の者
- ④ 脂質のリスク保有率は中性脂肪が150mg/dl以上またはHDLコレステロールが40mg/dl未満の者
- ⑤ 代謝（空腹時血糖）のリスク保有率は空腹時血糖が110mg/dl以上の者
- ⑥ 喫煙者の割合は問診票において喫煙者であると回答した者
- ⑦ BMIのリスク保有率はBMI（肥満度）が25以上の者
- ⑧ 脂質（中性脂肪）のリスク保有率は中性脂肪が150mg/dl以上の者
- ⑨ 脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率はHDLコレステロールが40mg/dl未満の者

協会けんぽの医療費について (速報)

1. 協会けんぽ発足後1年間の医療費の状況
2. 協会けんぽの加入者における後発医薬品の使用状況

【1. 協会けんぽ発足後1年間の医療費の状況】


1年間の患者数と患者数割合(平成20年10月～平成21年9月)

	総計			
	入院	入院外	歯科	
患者数	201 万人	3,249 万人	1,561 万人	
患者数割合(%)	4.8 %	77.0 %	37.0 %	
(再掲) 加入期間が1年間ある患者数	144 万人	2,379 万人	1,231 万人	

注1. 患者数は、1年間のうちに病院・診療所又は調剤薬局を利用した加入者の人数。総計には、調剤薬局のみを利用した者を含む。

(診療年月が平成20年10月から平成21年9月で平成22年1月までに請求されたレセプト(医科歯科調剤)がある加入者の人数。)


注2. 患者数割合は、1年間のうちに加入期間がある加入者数(資格喪失者等を含む)に対する1年間のうち1回以上病院・診療所又は調剤薬局を利用した加入者(患者)数の割合。



年間医療費階級別の患者構成割合と医療費構成割合

～ 加入期間が1年間ある患者（平成20年10月～平成21年9月）～

- ・患者のうち約6割が年間医療費10万円未満（医科歯科調剤計）
- ・年間医療費100万円以上の患者（全体の約2%）の医療費は、医療費全体の約3割を占める




年間医療費階級別の医療費の診療種別内訳

～ 加入期間が1年間ある患者（平成20年10月～平成21年9月）～

- ・年間医療費10万円未満の患者の医療費の約7割が入院外(調剤含む)医療費
- ・年間医療費100万円以上のほぼ全ての階級において入院医療費の占める割合が高いが500～599万円の階級のみ入院外医療費の占める割合の方が高くなっている

年間医療費階級別の医療費の診療種別内訳(構成割合)

(平成20年10月～平成21年9月)



注. 加入期間が1年間ある患者について、平成20年10月～平成21年9月までのレセプト(医科歯科調剤)から集計したもの

(参考) 患者の年間医療費階級別の主な傷病と医療費構成割合 (上位3位) (入院・入院外レセプトに限る)

年間医療費	主な傷病1	主な傷病2	主な傷病3
0～9万円	その他の急性上気道感染症[1003] (7%)	その他の損傷及びその他の外因の影響[1905] (5%)	屈折及び調節の障害[703] (5%)
10～19万円	高血圧性疾患[901] (13%)	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患[403] (5%)	喘息[1010] (4%)
20～29万円	高血圧性疾患[901] (9%)	糖尿病[402] (3%)	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患[403] (3%)
30～39万円	高血圧性疾患[901] (15%)	糖尿病[402] (6%)	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患[403] (5%)
40～49万円	高血圧性疾患[901] (9%)	糖尿病[402] (8%)	その他の消化器系の疾患[1112] (4%)
50～59万円	糖尿病[402] (7%)	高血圧性疾患[901] (6%)	その他の妊娠、分娩及び産じょく[1504] (5%)
60～69万円	糖尿病[402] (7%)	良性新生物及びその他の新生物[211] (6%)	高血圧性疾患[901] (5%)
70～79万円	良性新生物及びその他の新生物[211] (7%)	糖尿病[402] (6%)	高血圧性疾患[901] (4%)
80～89万円	良性新生物及びその他の新生物[211] (7%)	糖尿病[402] (5%)	その他の消化器系の疾患[1112] (3%)
90～99万円	良性新生物及びその他の新生物[211] (6%)	糖尿病[402] (4%)	その他の消化器系の疾患[1112] (3%)
100～199万円	その他の悪性新生物[210] (4%)	虚血性心疾患[902] (3%)	骨折[1901] (3%)
200～299万円	その他の悪性新生物[210] (6%)	虚血性心疾患[902] (5%)	関節症[1302] (4%)
300～399万円	その他の悪性新生物[210] (10%)	虚血性心疾患[902] (5%)	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害[503] (4%)
400～499万円	腎不全[1402] (14%)	その他の悪性新生物[210] (8%)	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害[503] (8%)
500～599万円	腎不全[1402] (28%)	その他の悪性新生物[210] (7%)	脳内出血[905] (3%)
600～699万円	腎不全[1402] (14%)	その他の悪性新生物[210] (8%)	脳内出血[905] (4%)
700～799万円	その他の悪性新生物[210] (8%)	腎不全[1402] (7%)	その他の心疾患[903] (5%)
800～899万円	その他の悪性新生物[210] (8%)	腎不全[1402] (7%)	その他の心疾患[903] (5%)
900～999万円	その他の悪性新生物[210] (7%)	その他の神経系の疾患[606] (6%)	腎不全[1402] (6%)
1000万円以上	白血病[209] (16%)	妊娠及び胎児発育に関連する障害[1601] (7%)	その他の神経系の疾患[606] (6%)


注1.平成20年10月～平成21年9月までに加入期間がある加入者について、同じ期間内の入院レセプト及び入院外レセプトを集計したもの

注2.傷病名が協会システムにおいて不明なレセプト分(手書きレセプト等)については、同じ年間医療費階級内の他のレセプトを用いて推計している

注3.青色は入院の傷病、赤色は入院外の傷病


注4.カッコ内は各年間医療費階級におけるの傷病別の医療費構成割合

【入院】



注. 加入期間が1年間ある患者について集計したもの


【入院外】



注. 加入期間が1年間ある患者について集計したもの


【入院】

(参考) 年間入院日数別の年間入院医療費階級別 入院患者数の構成割合
(平成20年10月～平成21年9月)




注. 加入期間が1年間ある患者について、平成20年10月～平成21年9月までのレセプト(入院)から集計したもの

【入院外】




注. 加入期間が1年間ある患者について、平成20年10月～平成21年9月までのレセプト(入院外と調剤)から集計したもので、年間入院外医療費には、調剤レセプト分を含む。

【2. 協会けんぽの加入者における後発医薬品の使用状況】



注. 平成20年10月～平成21年3月診療分の調剤レセプト(算定ベース)について集計したもの(電子レセプトに限る)

(参考) 後発医薬品の使用が多い主な薬効分類における後発医薬品割合 (金額ベース)



注1. 平成20年10月～平成21年3月診療分の調剤レセプト(算定ベース)について集計したもの(電子レセプトに限る)


注2. 括弧内は「日本標準商品分類」の「中分類87 医薬品及び関連製品」に準拠した分類番号

後発医薬品割合

平成20年度の健診データと医療費データの分析（速報）の抜粋


1 健診データの分析

年齢階級別メタボリックリスク保有者の割合




各リスクの有無別の喫煙率

男性



■ リスクなし ■ リスクあり

女性




■ リスクなし ■ リスクあり

(注1) 喫煙率は問診票の問に対し喫煙すると回答した人の割合である


(注2) リスクのある人とない人の年齢を調整した数値である

各リスクの有無別の食べる速度が速い人の割合

男性



女性



■リスクなし ■リスクあり

■リスクなし ■リスクあり

(注1) 食べる速度が速い人の割合は問診票の問に対し速いと回答した人の割合である

(注2) リスクのある人とない人の年齢を調整した数値である



血糖値の階級別インスリンまたは血糖を下げる薬を飲んでいる人の割合

男性

女性


- 薬を飲んでいる
- 薬を飲んでいない

- 薬を飲んでいる
- 薬を飲んでいない




2 健診データと医療費データを突合させた分析

各リスクの有無別1人当たり入院医療費



(注) リスクのある人とない人の年齢を調整した数値である

各リスクの有無別1人当たり入院外医療費（調剤を含む）



(注) リスクのある人とない人の年齢を調整した数値である

[参考]

○健診データの集計について

- ・平成20年度の1年間、協会けんぽ（政府管掌健康保険）に継続して加入した35歳以上の被保険者に係る平成20年度的生活習慣病予防健診（一般健診、付加健診）のデータを使用した。

- ・各リスク保有率は、健診受診者のうち、次の者の占める割合としている。

- ① メタボリックシンドロームリスク保有率は、②に加え、③～⑤のうち2項目に該当する者
- ② 腹囲のリスク保有率は、男性は85cm以上、女性は90cm以上の者
- ③ 血圧のリスク保有率は最高血圧が130mmHg以上または最低血圧が85mmHg以上の者
- ④ 脂質のリスク保有率は中性脂肪が150mg/dl以上の者またはHDLコレステロールが40mg/dl未満の者
- ⑤ 代謝のリスク保有率は空腹時血糖が110mg/dl以上の者

○医療費データの集計について

- ・平成20年度の1年間、協会けんぽ（政府管掌健康保険）に継続して加入した35歳以上の被保険者に係る平成20年度のレセプトデータを使用した。